

Ćwiczenia z ANALIZY NUMERYCZNEJ (L)

Lista nr 3

16 października 2019 r.

Zajęcia 22 października 2019 r.
Zaliczenie listy **od 7 pkt.**

- L3.1.** **Włącz komputer!** **2 punkty** Dla jakich wartości x obliczanie wartości wyrażeń
a) $4 \cos^2 x - 3$, b) $\log_5 x - 6$

może wiązać się z utratą cyfr znaczących wyniku? Zaproponuj sposoby obliczenia wyniku dokładniejszego. Sprawdź czy sposoby te **działają w praktyce**.

- L3.2.** **Włącz komputer!** **1 punkt** Podaj (w miarę) bezpieczny numerycznie algorytm obliczania zer równania kwadratowego $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$). **Przeprowadź testy** dla odpowiednio dobranych wartości a, b i c pokazujące, że Twój algorytm jest lepszy od *metody szkolnej* bazującej jedynie na dobrze znanych wzorach $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$.

- L3.3.** **Włącz komputer!** **2 punkty** Miejsce zerowe wielomianu $x^3 + 3qx - 2r = 0$, gdzie $r, q > 0$, można obliczyć następującym wzorem Cardano-Tartaglii:

$$x = \left(r + \sqrt{q^3 + r^2}\right)^{1/3} + \left(r - \sqrt{q^3 + r^2}\right)^{1/3}.$$

Pokaż na przykładach, że bezpośrednie użycie tego wzoru w obliczeniach zmiennopozycyjnych może skutkować błędnymi wynikami. Co jest tego przyczyną? Spróbuj przekształcić wzór tak, aby uniknąć problemów (to może nie być łatwe). Czy obliczenia można zorganizować w taki sposób, aby tylko raz wyznaczać pierwiastek trzeciego stopnia?

- L3.4.** **1 punkt** Wyprowadź wzór na wskaźnik uwarunkowania zadania obliczania wartości funkcji f w punkcie x .

- L3.5.** **2 punkty** Sprawdź dla jakich wartości x zadanie obliczania wartości funkcji f jest źle uwarunkowane, jeśli:

- a) $f(x) = x^2 - 2019$, b) $f(x) = x / \ln(x)$, c) $f(x) = \cos(3x)$,
d) $f(x) = (\sqrt{x^2 + 2019} + x)^{-1}$.

- L3.6.** **2 punkty** Załóżmy, że dla każdego $x \in X_{fl}$ zachodzi $fl(\arctg(x)) = \arctg(x)(1 + \varepsilon_{a,x})$, gdzie $|\varepsilon_{a,x}| \leq 2^{-t}$, natomiast t oznacza liczbę bitów przeznaczoną na zapamiętanie mantysy. Niech dane będą liczby maszynowe y_1, y_2, y_3, y_4 oraz taka liczba maszynowa x , że $x \cdot 2^{-8}$ też jest liczbą maszynową. Sprawdź czy poniższy algorytm jest numerycznie poprawny:

```

S:=0;

for i from 1 to 4
do
S:=S+y[i]*atan(4^(-i)*x)
od;

Return(S) .

```

L3.7. 1 punkt Sprawdź czy następujący algorytm obliczania wartości wyrażenia $w(x) := x + x^{-1}$ ($x \neq 0$) jest algorytmem numerycznie poprawnym:

```

u:=x;
v:=1/x;

Return(u+v)

```

W rozważaniach przyjmij, że x jest liczbą maszynową.

L3.8. Dodatkowe zadanie programistyczne (do 6 listopada; do 5 punktów)¹

W zadaniu **L1.7** przedstawiono dwa sposoby aproksymowania pochodnej funkcji:

$$(1) \quad f'(t) \approx \frac{f(t+h) - f(t)}{h}, \quad f'(t) \approx \frac{f(t+h) - f(t-h)}{2h} \quad (h - \text{małe}).$$

Przybliżenia pochodnej funkcji znajdują zastosowanie m.in. w numerycznym rozwiązywaniu równań różniczkowych, w tym tzw. *równań ruchu*. Znając położenie i prędkość obiektu w chwili t (w wypadku drugiego wzoru, odpowiednio, $t-h$ oraz t), jak również działające na niego siły, z użyciem powyższych wzorów można **przybliżyć** jego położenie oraz prędkość w chwili $t+h$.

Rozpatrujemy ruch układu ciał oddziałujących wzajemnie na siebie poprzez siłę grawitacji (przyda się znane ze szkoły prawo powszechnego ciężenia Newtona: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$). Celem jest określenie, na podstawie początkowego położenia ciał i ich prędkości w chwili t , jaki będzie stan układu w kolejnych ustalonych chwilach, np. $t+h, t+2h, t+3h, \dots$

- (a) Wyprowadź układ równań ruchu dla **dwóch** ciał wzajemnie się przyciągających.
- (b) Sprawdź na przykładzie dwóch ciał, które z powyższych przybliżeń pochodnej lepiej sprawdza się w praktyce (dla tego samego h).

Wskazówka nr 1. Bardzo dobrze będzie to widać, jeżeli układ przypomina planetę krążącą wokół słońca.

Wskazówka nr 2. Metodę wykorzystującą pierwszy z wzorów (1) można znaleźć w literaturze pod nazwą *metody Eulera* przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych.

¹Patrz pkt. 12. regulaminu zaliczania ćwiczeń.

- (c) Choć dla dwóch przyciągających się ciał znane jest jawne rozwiązanie analityczne, to w wypadku trzech (tzw. **problem trzech ciał**) lub więcej obiektów — wzorów takich nie ma. Zadanie można rozwiązywać wyłącznie w sposób przybliżony stosując metody numeryczne. Korzystając z podanych możliwości aproksymowania pochodnej, znajdź przybliżone rozwiązanie problemu trzech (lub więcej) ciał dla kilku istotnie różnych układów (np. układ Słońce-Ziemia-Księżyc, planeta krążąca wokół gwiazdy podwójnej, wykorzystanie zjawiska asysty grawitacyjnej, ...).

(-) *Paweł Woźny*