


Zadania z matematyki dyskretnej, lista nr 12

- Zastosuj przeszukiwanie grafu spójnego w głąb do znajdowania wierzchołka *rozcinającego*, tzn. takiego którego usunięcie rozspaja graf (jeśli taki wierzchołek istnieje). Twoja procedura powinna mieć złożoność $O(m+n)$.
- Zastosuj przeszukiwanie grafu w głąb do sprawdzania, czy graf jest dwudzielny. Twoja procedura powinna mieć złożoność $O(m+n)$.
- Topologiczne porządkowanie wierzchołków*. Niech G będzie digrafem acyklicznym (bez skierowanych cykli). Napisz procedurę, która w czasie $O(n+m)$ przyporządkowuje numery wierzchołkom w taki sposób, że gdy (i, j) jest łukiem w G , to $i < j$.
- Używając algorytmów Prima–Dijkstry i Kruskala, wyznacz najkrótszy podzbiór dróg z Rysunku poniżej taki, że po tym podzbiórze dróg można dojechać z każdego węzła tej sieci do każdego innego. Ponumeruj krawędzie tego podzbioru w kolejności, w jakiej dołączają je do niego oba te algorytmy.
- Używając algorytmu Dijkstry wyznacz drzewa najkrótszych dróg z Dw. Głównego, pl. Grunwaldzkiego i Browaru w sieci z Rys. 1. Ponumeruj krawędzie drzew w kolejności dołączania przez algorytm.
- Pokaż, w jaki sposób można znaleźć najdłuższe drzewo rozpinające grafu z wagami.
- Podaj szybką implementację algorytmu Warshalla dla obliczania przechodniego domknięcia grafu o 32 wierzchołkach. Macierz sąsiedztwa zawarta jest w postaci tablicy 32 słów 32-bitowych reprezentujących kolejne wiersze. Możesz wykonywać operacje logiczne na słowach 32 bitowych.
- Zmodyfikuj tak algorytm Warshalla–Floyda, aby znajdował nie tylko długości najkrótszych dróg między parami wierzchołków, ale również te drogi.
- W digrafie może istnieć wiele minimalnych dróg z wierzchołka v do u . Zmodyfikuj tak algorytm Dijkstry, żeby wyznaczał nie drzewo najkrótszych dróg, a acykliczny digraf będący sumą najkrótszych dróg z wierzchołka v do wszystkich innych.
- Drzewo z dodaną jedną krawędzią nazywamy 1-drzewem. Zaproponuj (działający w rozsądnym czasie) algorytm znajdujący najkrótsze 1-drzewo spinające grafu z wagami i uzasadnij jego poprawność.
- Niech G będzie grafem z nieujemnymi wagami na krawędziach. Niech $MST(G)$ oznacza długość najlżejszego drzewa spinającego w G , a $TSP(G)$ oznacza długość najkrótszej drogi komiwojażera w G (komiwojażer może odwiedzać wierzchołki wielokrotnie). Wykaż, że

$$MST(G) \leq TSP(G) \leq 2 \cdot MST(G).$$



- (Dualny algorytm chciwości) Udowodnij, że po wykonaniu kroków 1 i 2, T jest najkrótszym drzewem rozpinającym grafu G .
 Krok 1: Niech $c(e_1) > c(e_2) > \dots > c(e_m)$;
 Krok 2: $T := E(G)$;
 for e_1, e_2, \dots, e_m do
 if $T \setminus e_i$ jest grafem spójnym
 then $T := T \setminus e_i$.
- (Twierdzenie Mengera) Graf jest krawędziowo k -spójny gdy jest spójny i usunięcie z niego co najwyżej $k-1$ krawędzi nie rozspójnia go. Używając przepływów w sieciach pokaż, że G jest krawędziowo k spójny wtedy i tylko wtedy gdy między każdymi dwoma wierzchołkami istnieje k krawędziowo rozłącznych dróg.
- (Wersja wierzchołkowa Twierdzenia Mengera) Graf jest k -spójny gdy jest spójny i usunięcie z niego co najwyżej $k-1$ wierzchołków nie rozspójnia go. Pokaż, że G jest k -spójny wtedy i tylko wtedy gdy między każdymi dwoma niesąsiednimi wierzchołkami istnieje k wierzchołkowo rozłącznych dróg.